

RAADSEL

Op deze pagina's zie je een aantal planten. Welke zijn oorspronkelijk inheems of ingeburgerd en hoe lang al?

Op de volgende pagina vind je de antwoorden.



Grove den



Donkere ooievaarsbek



Fraaie vrouwenmantel



Groot spiegelklokje



Zuurbes



Gele maskerbloem



Aardaker



Donker kaasjeskruid



Haagbeuk

Foto's:
van Donkelaar Groenadvies: donkere ooievaarsbek, groot spiegelklokje, gele maskerbloem, donker kaasjeskruid, gewoon sneeuwklokje, wilde narcis, harig knopkruid.
Overig: Machteld Klees



Gewoon
sneeuwklokje



Gele helmbloem



Paarse
schubwortel



Phacelia



Groot glas-
kruid



Korenbloem



Daslook



Middelste
teunisbloem



Wilde narcis



Roggelelie



Gevlekt longkruid



Harig knopkruid



BIJ DE VORIGE PAGINA'S:

Oorspronkelijk inheems:

Soorten die zich hier na de laatste ijstijd op eigen kracht vestigden.

Aardaker

Daslook, Nederland ligt aan de noordwest grens van het Europese deel van het verspreidingsgebied. Vooral in Zuid-Limburg, in Wallonië en de Ardennen. Elders stinzenplant.

Gevlekt longkruid. Komt voor in Zuid-Limburg en Wallonië, elders stinzenplant.

Zuurbes

Wilde narcis, in Nederland zeldzaam, ook als stinzenplant. In België plaatselijk vrij algemeen. Haagbeuk

Archeofyten

Soorten die al voor 1500 ingevoerd zijn.

Groot spiegclklokje, herkomst Europa.

Groot glaskruid, herkomst Midden-Europa.

Korenbloem, uit omgeving Turkije.

17e eeuw

Grove den, herkomst Europa.

Middelste Teunisbloem, herkomst Noord-Amerika.

18e eeuw

Donkere ooievaarsbek, herkomst Zuid-Europa.

Gewoon sneeuwkllokje werd in de 17e eeuw in cultuur gebracht. De herkomst is Centraal- en Zuid-Europa. Pas in de 18e eeuw begon het sneeuwkllokje succesvol in te burgen.

19e eeuw

Gele helmblom, herkomst Alpen en Jura.

Gele maskerblom, herkomst Noord-Amerika. Staat niet op de Europese lijst van invasieve exoten, maar wordt wel als invasief gezien, vooral in moerasachtige gebieden. Harig knopkruid, herkomst Midden-Amerika.

Roggelelie, afkomstig uit Midden- en Zuid-Europa. Ingeburgerd vanaf tenminste 1850 (zie het tijdschriftarchief op www.stichtingoa-se.nl).

Recent

Phacelia, ingeburgerd tussen 1975 en 1999, afkomstig uit Californië.

Donker kaasjeskruid (*Malva sylvestris* var. *mauritanica*) wordt vaak in zaadmengsels gebruikt, deze geldt

als adventief/verwilderend. Groot kaasjeskruid (*Malva sylvestris*) is een archeofyt.

Fraaie vrouwenmantel, ingeburgerd tussen 1950 en 1974. Oorspronkelijk uit Midden-Europa, Zuidoost-Europa en aansluitend Azië. Ook elders in Europa ingeburgerd, o.a. op IJsland.

Inkarnaatklaver niet-ingeburgerd: adventief /verwilderend.

Paarse schubwortel, niet ingeburgerd, komt voor in Zuid-Europa, tot in Midden-Frankrijk. Enkele geïsoleerde vindplaatsen in Italië en België. De soort wordt regelmatig in heemtuinen aangeplant, vooral dankzij C. Sipkes, de oprichter van heemtuin Tenellaplas. Vanaf wanneer de plant wordt toegepast, kon ik niet achterhalen (zie het tijdschriftarchief op www.stichtingoa-se.nl).

Gegevens uit:

www.verspreidingsatlas.nl
Oecologische flora.

Samenstelling: Machteld Klees,
reacties naar info@stichtingoa-se.nl